



Cymru - ystadegau am glefyd cardiofasgwlaidd gan British Heart Foundation (BHF)

Mae ystadegau iechyd yn rhoi syniad i'n staff, ein gwirfoddolwyr, ein cefnogwyr a'n rhanddeiliaid o faint yr heriau sy'n ein hwynebu. Seilir yr ystadegau a welir yma ar arolygon swyddogol a ffynonellau dibynadwy eraill.

Dim ond ychydig o'n hystadegau ar gyfer Cymru sydd yma. Gallwch droi unrhyw un ohonynt yn jpeg trwy ei chwyddo a defnyddio Snipping Tool neu Paint.

Mae tua
340,000
o bobl yn byw gyda chlefyd
cardiofasgwlaidd yng Nghymru

Mae dros
110,000
o bobl yn byw gyda
chlefyd coronaidd y galon
yng Nghymru

Mae dros **42,000**
o bobl yng Nghymru
wedi cael diagnosis o
fethiant y galon
gan eu meddyg teulu

Bob mis, caiff tua
18 o fabanod
yng Nghymru ddiagnosis
o ddiffyg cynhenid ar y galon

Mae dros
70,000 o bobl sy'n
byw yng Nghymru
wedi cael strôc

Bob
100 munud
caiff rhywun yng Nghymru
ei dderbyn i'r ysbyty oherwydd
trawiad ar y galon

Ers sefydlu BHF, mae nifer y bobl
sy'n marw yng Nghymru bob blwyddyn
o glefyd cardiofasgwlaidd fwy
neu lai wedi haneru

Mae clefyd cardiofasgwlaidd
yn achosi tua **27 o**
farwolaethau bob dydd
yng Nghymru

Mae clefyd
cardiofasgwlaidd yn lladd
1 o bob 4 o bobl Cymru

Bob blwyddyn, mae tua
2,900
o bobl yn marw cyn pryd o
glefyd cardiofasgwlaidd yng Nghymru

Mae dros
80,000
o bobl yng Nghymru wedi
cael diagnosis o ffibriliad atrïaidd

Bob
140 munud
mae rhywun yng Nghymru'n
marw o glefyd coronaidd y galon

Bob blwyddyn mae tua
2,800 o bobl yng Nghymru
yn cael ataliad y galon yn
rhywle heblaw ysbyty

Yng Nghymru, **dim ond 1 o bob 20**
o bobl sy'n byw ar ôl ataliad y
galon yn rhywle heblaw ysbyty

Cyn sefydlu BHF, roedd y rhan
fwyaf o fabanod oedd yn cael
diagnosis o glefyd cynhenid
difrifol ar y galon yn marw
cyn eu pen blwydd cyntaf

Heddiw yn y DU,
diolch i waith
ymchwil, mae mwy na
4 o bob 5 yn byw i
fod yn oedolion

Mae gan tua **30,000** o
bobl Cymru enyn sy'n
amrywiolyn ac a all achosi
cyflwr etifeddol ar y galon

Bob blwyddyn,
mae cyfanswm
costau gofal
iechyd am glefyd
cardiofasgwlaidd yn

£770
MILIWN

Mae gan ryw **16,000**
o bobl yng Nghymru gyflwr
etifeddol ar y galon

Bob blwyddyn,
mae cyfanswm
cost economaidd
clefyd cardiofasgwlaidd
yng Nghymru tua

£1.7
BILIWN

Cyswllt rhwng y clefydau

Mae pobl sydd â diabetes
ddwywaith yn fwy tebygol
o gael strôc

Mae pobl sydd â hanes
o glefyd coronaidd y
galon yn y teulu **gryn**
dipyn yn fwy tebygol
o gael dementia fasgwlaidd

Yn y Deyrnas Unedig,
mae **un o bob tri** o'r
oedolion sydd â diabetes
yn marw o glefyd
cardiofasgwlaidd

Mae pobl sydd â
methiant y galon **ddwy**
neu dair gwaith yn fwy
tebygol o gael strôc

Yng Nghymru, mae **dros hanner**
yr achosion o drawiad ar y
galon a strôc yn gysylltiedig â
phwysedd gwaed uchel

Mae dementia
fasgwlaidd ar tua
180,000 o bobl
y Deyrnas Unedig

Ffactorau Risg

Mae tua
530,000
o bobl yng Nghymru wedi
cael diagnosis o bwysedd
gwaed uchel

Mae dros **220,000**
o oedolion Cymru wedi
cael diagnosis o ddiabetes

Mae
gordewdra ar tua
26%
o oedolion Cymru

Mae tua
25%
o blant blwyddyn
derbyn yng Nghymru
â BMI a ddiffinnir fel
dros bwysau neu gordew

Nid yw tua
45%
o oedolion Cymru'n gwneud cymaint
o ymarfer corff ag yr argymhellir

... gair am BHF

Rydym yn ariannu **MWY** o
waith ymchwil cardiofasgwlaidd
na'r un corff annibynnol
arall yng Nghymru

Mae o leiaf
13%
o oedolion
Cymru'n smygu

Mae
bron
900
o farwolaethau o glefyd
cardiofasgwlaidd yng
Nghymru bob blwyddyn
yn cael eu cysylltu â smygu

Adolygwyd a diweddarwyd ym mis Awst 2025.
Disgwylir yr adolygiad nesaf cyn diwedd 2025.

Ar gael yn Saesneg hefyd. Also available in English

Gwelir y cyfeiriadau ar ein taflenni yn:
<https://www.bhf.org.uk/statistics>
Sut y gallwch chi helpu:
<https://www.bhf.org.uk/how-you-can-help>
Cysylltwch â ni os oes gennych ryw gwestiwn:
healthinsights@bhf.org.uk